

**MATEMATICA GENERALE - Canali II, III, IV**  
Sessione Invernale, III Appello, 15/02/11, A.A. 2010/2011 - Compito 3

Cognome ..... Nome ..... Matricola .....

Canale    ☐ II (Prof. Gibilisco)                      ☐ III (Prof.ssa Fabretti)                      ☐ IV (Prof.ssa Tessitore)

Firma .....

1) (9 p.ti) Studiare la funzione  $f(x) = -x - \frac{1}{|x|}$

a] Dominio e segno

b] Limiti

c] Determinazione punti critici (ovvero stazionari)

d] Studio massimi e minimi

e] Grafico (lo studio di eventuali flessi è opzionale).

2) (6 p.ti) Calcolare

$$\int_1^e \frac{1}{x \log(x^3)} dx$$

3) (6 p.ti) Studiare al variare del parametro  $c \in \mathbb{R}$  le soluzioni del sistema e trovarle:

$$\begin{cases} y + cz = 0 \\ cx + cz = 1 \\ x + cy + z = 0 \end{cases}$$

*Individuare la risposta corretta nelle seguenti domande a risposta multipla. Ogni risposta esatta vale 2 punti, ogni risposta sbagliata -1 punto, risposta non data 0 punti, l'ultima domanda vale 2 punti.*

4) (2 p.ti) Il teorema di Cramer e' un caso particolare del teorema di Rouche'-Capelli.  
☐ Vero ☐ Falso

5) (2 p.ti) La funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è sia concava che convessa. Quindi:

1. la funzione  $f$  è una retta;
2. la funzione  $f$  è una costante;
3. non esiste una funzione che sia concava e convessa allo stesso tempo.

6) (2 p.ti) La funzione  $f(x) = x|x|$  e' derivabile due volte nel punto 0.  
☐ Vero ☐ Falso

7) (2 p.ti) La successione  $a_n := (-1)^n \frac{n}{n^2-1}$

1. converge;
2. diverge;
3. non ammette limite.

8) (2 p.ti) Illustrare con dei controesempi il ruolo delle ipotesi nel teorema di Rolle.