

MATEMATICA GENERALE - Canali II, III, IV

Sessione Invernale, III Appello, 9/02/10, A.A. 2009/2010 - Compito 2

Cognome Nome Matricola

Canale ☐ II (Prof. Scarlatti) ☐ III (Prof.ssa Fabretti) ☐ IV (Prof.ssa Tessitore)

Firma

1) (10 p.ti) Studiare la funzione $f(x) = \frac{e^{-x}}{x-1}$

a] Dominio e segno

b] Limiti

c] Determinazione punti critici (ovvero stazionari)

d] Studio massimi e minimi

e] Grafico (lo studio di eventuali flessi è opzionale).

2) (6 p.ti) Determinare dominio e punti stazionari della funzione

$$f(x, y) = \frac{x^3}{3} + xy^2 - 4x - 2y$$

3) (8 p.ti) Studiare al variare del parametro $t \in \mathbb{R}$ le soluzioni del sistema e trovarle:

$$\begin{cases} x - y = t + 1 \\ x + y = 1 \\ x - 2y = t \end{cases}$$

Individuare la risposta corretta nelle seguenti domande a risposta multipla. Ogni risposta esatta vale 2 punti, ogni risposta sbagliata -1 punto, risposta non data 0 punti.

4) (2 p.ti) Il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

1. vale 0
2. vale 1
3. vale ∞
4. vale e

5) (2 p.ti) La retta $y = -2x + 3$ nel punto $x_0 = 1$ risulta tangente al grafico della funzione:

1. $f(x) = e^{1/x-1}$
2. $f(x) = e^{1-x^2}$
3. $f(x) = e^{-x^2-1}$
4. nessuna delle precedenti

6) (2 p.ti) La funzione $f(x) = \frac{1}{x}$

1. è integrabile in $[1, 2]$
2. ha primitiva $\log(x)$
3. è integrabile in $[-1, 1]$
4. nessuna delle precedenti

7) (2 p.ti) Sia $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ un sistema omogeneo di n equazioni lineari in n incognite, il sistema ammette soluzioni non banali se

1. $\det(A) = 0$
2. se il rango di A è pari ad n
3. $\det(A) \neq 0$
4. Nessuno delle precedenti