

MATEMATICA GENERALE - Canali II, III, IV

Sessione Invernale, I Appello, 18/01/11, A.A. 2010/2011 - Compito 2

Cognome Nome Matricola

Canale ☐ II (Prof. Gibilisco) ☐ III (Prof.ssa Fabretti) ☐ IV (Prof.ssa Tessitore)

Firma

1) (9 p.ti) Studiare la funzione $f(x) = \sqrt{\frac{4-x^2}{3-x}}$

a] Dominio e segno

dominio: $D = [-2, 2] \cup (3, \infty)$

segno : $f(x)$ sempre positiva nel suo dominio D

b] Limiti e asintoti

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

c] Determinazione punti critici (ovvero stazionari)

$$f'(x) = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3-x}{4-x^2}} \cdot \frac{-2x(3-x) + (4-x^2)}{(3-x)^2} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3-x}{4-x^2}} \cdot \frac{x^2 - 6x + 4}{(3-x)^2}$$

$f'(x)$ si annulla in $x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{5}$.


d] Studio massimi e minimi

$f'(x) > 0$ in $(-2, 3 - \sqrt{5})$ e $(3 + \sqrt{5}, \infty)$

$f'(x) < 0$ in $(3 - \sqrt{5}, 2)$ e $(3, 3 + \sqrt{5})$

$f(x)$ ha un minimo in $x = 3 + \sqrt{5}$ e un massimo in $x = 3 - \sqrt{5}$

e] Grafico (lo studio di eventuali flessi è opzionale).



2) (5 p.ti) Calcolare

$$\int -2x(e^{(5x^2-3)} - 3x^2)dx$$

Soluzione: si può spezzare in due integrali di quasi immediata risoluzione

$$\int -2xe^{(5x^2-3)}dx + \int 6x^3dx$$

il primo si risolve usando

$$\int f'(x)e^{f(x)}dx = e^{f(x)} + c$$

il secondo si risolve usando

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

con opportuni aggiustamenti delle costanti la soluzione risulta

$$-\frac{1}{5}e^{(5x^2-3)} + \frac{3}{2}x^4 + c$$

3) (7 p.ti) Studiare al variare del parametro $t \in \mathbb{R}$ le soluzioni del sistema e trovarle:

$$\begin{cases} y - t^2 z = -1 \\ y - z = t \end{cases}$$

Soluzione:

Matrice incompleta

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -t^2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Matrice completa

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -t^2 & -1 \\ 1 & -t & t \end{pmatrix}$$

Il determinante della matrice A è $1 - t^2$ e si annulla in $t = \pm 1$.

Se $t \neq \pm 1$ la matrice A e la matrice \tilde{A} hanno rango uguale, pari a 2. Per il Teorema di Rouché Capelli esiste un'unica soluzione:

$$y = -\frac{t^2 - t + 1}{t - 1} \qquad z = -\frac{1}{t - 1}$$

Se $t = -1$ la matrice A e la matrice \tilde{A} hanno rango uguale, pari a 1. Per il Teorema di Rouché Capelli esistono ∞^1 soluzioni:

$$(y, z) = (\alpha - 1, \alpha) \quad \text{con} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Se $t = 1$ la matrice A ha rango 1 e la matrice \tilde{A} ha rango pari a 2. Per il Teorema di Rouché Capelli non esistono soluzioni.

Individuare la risposta corretta nelle seguenti domande a risposta multipla. Ogni risposta esatta vale 2 punti, ogni risposta sbagliata -1 punto, risposta non data 0 punti, l'ultima domanda vale 2 punti.

4) (2 p.ti) Sia definita la funzione $F(x) = \int_1^x \frac{2-t}{\log(t^2+1)} dt$, possiamo affermare che

1. la funzione $F(x)$ è crescente in $(1, 2)$; ✓
2. la funzione $F(x)$ è decrescente in $(1, 2)$;
3. la funzione $F(x)$ non è né crescente né decrescente in $(1, 2)$.

5) (2 p.ti) Assegnati i vettori $\mathbf{v} = (-1, 2, 0)$, $\mathbf{w} = (-8, 16, 0)$, possiamo concludere che

1. \mathbf{v} e \mathbf{w} sono linearmente indipendenti;
2. \mathbf{v} e \mathbf{w} sono linearmente dipendenti; ✓
3. \mathbf{v} e \mathbf{w} generano uno spazio vettoriale di dimensione 2.

6) (2 p.ti) Se la successione $\{a_n\}$ converge a l e $|b_n| \leq a_n \forall n \in \mathbb{N}$, si può affermare che la successione $\{b_n\}$ converge.

☐ Vero

☒ Falso

7) (2 p.ti) Sia definita la funzione $f(x) = x - \log(|x - 4|)$. Possiamo affermare che il suo dominio è

1. $(4, +\infty)$
2. $[4, +\infty)$
3. $(-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$ ✓

8) (2 p.ti) Scrivere la formula del polinomio di Taylor di grado n per una arbitraria funzione f in un punto x_0 . Calcolare il polinomio di Taylor di secondo grado della funzione $f(x) = \log(x + 3)$ in $x_0 = -1$.

Per la formula del polinomio di Taylor di grado n per una arbitraria funzione f in un punto x_0 vedere libro di testo, appunti, etc.

Per la seconda parte della domanda la risposta è

$$P_2(x) = \log 2 + \frac{1}{2}(x + 1) - \frac{1}{8}(x + 1)^2$$